

Enrocol

Specia de animal	Păsări, porci.
Compoziția	Enrofloxacină 100 mg Colistină 1000000 UI
Indicații	Enrocol este administrat la păsări în caz de colibaciloză, salmoneloză, pasteureloză, micoplasmoză, sinovită infecțioasă, rinită infecțioasă, stafiloccoză. La porci în caz de caolibaciloză, bordetelioză, salmoneloză, enterită, infecții toxice și alte boli cauzate de microorganisme sensibile la componentele medicamentului.
Contraindicații	Este contraindicată administrarea combinată a medicamentului cu antibiotice bacteriostatice (tetraciclina, macrolide, amfenicol), steroizi, anticoagulante indirecte. Medicamentul este contraindicat în cazurile de afectare a funcției renale, a funcției hepatice, hipersensibilitate la fluorchinolon și colistină.
Doze și mod de administrare	Păsări: 0,1 ml pentru 1 kg de greutate corporală sau 1 L de produs la 2000 L de apă, o dată pe zi prin metoda de grup, timp de 3-5 zile. Pentru păsări, soluția de produs este pregătită în baza necesității de apă pentru o zi. În perioada de tratament pasăre trebuie să primească numai apă care conține medicament. Porci: 0,3 ml la 10 kg de greutate corporală o dată pe zi timp de 3-5 zile. Înainte de utilizare medicamentul este diluat cu apă în raport 1:1 În cazul bolilor severe doza este majorată până la 0,5 ml pentru 10 kg de greutate a animalului.
Perioada de așteptare	Sacrificarea păsărilor pentru carne este permisă peste 12 zile, iar a porcilor peste 15 zile după ultima administrare a medicamentului. Nu se va utiliza la păsările care produc ouă pentru consum uman.
Forma de prezentare	Produsul este ambalat în flacoane de sticlă de 100, 400, 500 ml, și ambalaj polimeric de 20, 100, 500, 1000 și 5000 ml.
Perioada de valabilitate	Perioada de valabilitate a produsului medicinal veterinar așa cum este ambalat pentru vânzare: 2 ani. Perioada de valabilitate după prima deschidere: 30 zile