

PARAMICIN

Specia de animal	Păsări de curte (pui, pui de carne, curcani).
Compoziția	1 ml de preparat conține, mg: Enrofloxacină - 120 mg; Sulfat de colistina - 1.200.000 UA. Excipienți: Trilon B, n-butanol, acid lactic, 1,2-propilenglicol, apă purificată.
Indicații	Tratamentul păsărilor bolnave de colibaciloză, pasteureloză, salmoneloză, micoplasmoză, infecții respiratorii cronice (IRC), stafilococoză și campilobacterioză cauzate de microorganisme sensibile la enrofloxacină și colistină.
Contraindicații	Hipersensibilitate la enrofloxacină și colistină. A nu se utiliza la animalele cu insuficiență renală sau hepatică. A nu se utiliza concomitent cu medicamente tetraciclone, macrolide (eritromicină), cloramfenicol, teofilină. A nu se utiliza la găinile ouătoare, ale căror ouă sunt folosite pentru consumul uman.
Doze și mod de administrare	Se administrează oral, cu apă de băut în doza: - păsări de curte (găini, pui de carne, curcani): 0,7 ml de medicament la 10 kg masă corporală (care corespunde cu 8,4 mg de enrofloxacină și 75.000 UI de colistina la 1 kg de masă corporală). Cursul tratamentului este de 5 zile. Se aplica la intervale de 24 de ore. Agitați fiola sau sticla (canistră) cu soluția înainte de utilizare. În timpul perioadei de tratament, animalele trebuie să primească numai apă care conține medicamentul.
Peroada de așteptare	Pentru carne - 12 zile.
Forma de prezentare	Fiole de sticlă neutră NS-1, NS-2, USP-1 sau polimer, a câte 0,5, 0,75, 10 și 20 ml. Sticle din polimer sau sticla de 10, 20, 50, 100 și 200 ml. Ambalaj secundar – cutie de carton. Sticle de polimer (canistre) de 1 L, 1,5 L și 5 L.
Perioada de valabilitate	Perioada de valabilitate a preparatului în ambalajul producătorului: 24 luni. Perioada de valabilitate după prima deschidere a recipientului este de 3 luni.