

COLIVETOPRIM

pulbere hidrosolubilă

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament de uz veterinar deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului veterinar sau farmacistului.
- Dacă s-au manifestat orice reacții adverse, adresați-vă medicului veterinar, farmacistului veterinar sau Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor
- Acestea includ orice posibile reacții adverse nementionate în acest prospect.

Suplimentar pentru medicamentul de uz veterinar disponibil numai cu prescripție veterinară:

- Acest medicament de uz veterinar a fost prescris numai pentru animalele dumneavoastră. Nu trebuie să-l dați altor persoane, care îl pot utiliza greșit.

1. DENUMIREA ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ȘI ALE PRODUCĂTORULUI/FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

Numele și adresa: S.A "Farmavet", MD-2059, Republica Moldova, Chișinău, Petricani 198.

Telefon: 31-72-70; 31-72-67; 99-92-89;

Fax: 31-72-68; e-mail: farmavet2017@gmail.com

2. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, CONCENTRAȚIA ȘI FORMA FARMACEUTICĂ ALE ACESTUIA

Substanța(e) activă(e): Colistină sulfat - **1200000 UI**

Trimetoprim - **20,0 mg**

Lista excipienților: Lactoză până la 1 g

3. INDICAȚII TERAPEUTICE

Produsul se recomandă la viței, miei, iezi, suine, iepuri și păsări în tratamentul infecțiilor gastro - intestinale determinate de germeni sensibili la colistin și trimetoprim.

4. CONTRAINDICAȚII

A nu se utiliza în caz de grave disfuncții hepatice sau renale și în cazuri cunoscute de alergii la trimetoprim.

5. REACȚII ADVERSE

Nu se cunosc.

6. SPECII ȚINTĂ: Porcine, bovine, ovine, caprine, păsări, iepuri.

7. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, METODA, MODUL DE ADMINISTRARE ȘI DOZA PRESCRISĂ

Produsul se administrează oral în hrana lichidă sau apa de băut.

Tratament curativ:

- Porcine 1 gr la 10 kg greutate corporală/zi.
- Păsări, iepuri: 1 gr la 10 kg greutate corporală/zi sau 1 gr la 1 litru apă de băut/zi
- Bovine, ovine, caprine: 1 gr la 10 kg greutate corporală/zi sau 1 gr la 1 litru apă de băut/zi.

Tratamentul trebuie urmat timp de 3-5 zile.

Profilactic de folosit ½ din dozele indicate în tratament curativ.

8. PERIOADA DE AȘTEPTARE

Carne și organe: 7 zile

Ouă: Ouăle provenite de la păsări tratate cu Colivetoprim nu sunt destinate consumului uman, (în timpul perioadei de ouat și / sau cu 4 săptămâni înainte de debutul perioadei de ouat).

9. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A nu se lăsa la îndemâna copiilor!

A nu se păstra la temperatură mai mare de 25°C.

A se păstra la loc uscat.

A se proteja de lumină.

A nu se utiliza după data expirării marcată pe etichetă.

Perioada de valabilitate a produsului medicinal veterinar după prima deschidere a ambalajului primar: 3 luni.

Perioada de valabilitate a produsului medicinal veterinar așa cum este ambalat pentru vânzare: 2 ani.

10. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR

Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deșeu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu cerințele locale.

11. ATENȚIONĂRI SPECIALE

Precauții speciale pentru utilizare la animale. Pulbere pentru soluție orală este destinată dizolvării în lapte, furaje lichide sau apa potabilă și nu poate fi utilizată ca atare.

Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale.

În caz de hipersensibilitate la polimixine sau trimetoprim, să se evite contactul cu produsul medicinal veterinar. Echipamentul individual de protecție constând din mănuși și mască trebuie să fie purtat atunci când se manipulează produsul medicinal veterinar. Evitați inspirarea de praf rezultat

de la produs și contactul cu pielea și ochii. În cazul în care, după expunerea la produs apar simptome cum ar fi erupții cutanate, solicitați sfatul medicului și prezentați eticheta produsului. Umflarea feței, buzelor și a ochilor sau dificultăți în respirație sunt simptome mult mai grave și necesită asistența medicală de urgență.

12. PERIOADA DE VALABILITATE

24 luni.

A nu se utiliza după expirarea termenului de valabilitate indicat pe ambalaj.

13. STATUT LEGAL

- *se eliberează în baza prescripției veterinare.*

14. NATURA ȘI COMPOZIȚIA AMBALAJULUI PRIMAR

Punga din aluminiu hidrofobizate a câte 50 g și 1000 g în interiorul unei cutii de carton.

15. DATA ULTIMEI REVIZUIRI A TEXTULUI

Iunie 2019

NUMAI PENTRU UZ VETERINAR