

## PROSPECTUL MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

### Metristar

#### *Suspensie pentru administrarea intrauterină*

**Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament de uz veterinar deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.**

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului veterinar sau farmacistului.
- Dacă s-au manifestat orice reacții adverse, adresați-vă medicului veterinar, farmacistului veterinar sau Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor
- Acestea includ orice posibile reacții adverse nementionate în acest prospect.

*Suplimentar pentru medicamentul de uz veterinar disponibil numai cu prescripție veterinară:*

- Acest medicament de uz veterinar a fost prescris numai pentru animalele dumneavoastră. Nu trebuie să-l dați altor persoane, care îl pot utiliza greșit.

### **1. DENUMIREA ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ȘI ALE PRODUCĂTORULUI/FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR**

Întreprinderea Particulară „OLKAR-AgroZooVet-Service”

str. Eroilor Maidanului (Lenin), 272B, or. Șargorod, reg. Vinița, 23500, Ucraina  
tel. / fax: (0432) 55-14-28, (0432) 55-14-27

### **2. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, CONCENTRAȚIA ȘI FORMA FARMACEUTICĂ ALE ACESTUIA**

1 tub de seringă (19 g) conține substanță activă:

Cefapirin benzatine - 500 mg.

**Lista excipienților:** polioxil -20, polioxil -12, alcool benzilic, ulei de ricin, kolisolv MST70.

### **3. INDICAȚII TERAPEUTICE (pe specii țintă)**

În tratamentul vacilor cu endometrită subacută și cronică (care pot fi prezente după 14 zile după fătare) cauzată de microorganisme sensibile la cefapirină.

### **4. CONTRAINDICAȚII**

A nu se utiliza mai devreme de 14 zile de la fătare.

A nu se administra animalelor cu hipersensibilitate la cefalosporine.

A nu se administra cu antibiotice din alte grupuri.

A nu se utiliza la animalele gestante.

## **5. REACȚII ADVERSE**

Nu sunt.

## **6. SPECII ȚINTĂ**

Vaci.

## **7. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, METODA, MODUL DE ADMINISTRARE ȘI DOZA PRESCRISĂ**

Intrauterin, folosind un cateter de unică folosință, se administrează conținutul unui tub de seringă, care, de regulă, este suficient pentru vindecarea completă a animalului.

Pentru aceasta, tubul seringii este conectat la cateter, se fixează colul uterin cu mâna, fixat prin rect, cateterul racordat la seringă este introdus cu atenție prin cervix în uter, se administrează conținutul prin apăsarea pistonului seringi. Dacă este necesar, repetați procedura după 48 de ore.

## **8. PERIOADA DE AȘTEPTARE**

Carne - 24 ore de la ultima administrare

Lapte – zero ore.

Până la ora specificată, produsele sunt eliminate sau hrănite animalelor neproductive, în conformitate cu concluzia medicului veterinar.

## **9. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE**

A se păstra la loc uscat, întunecat, inaccesibil copiilor, la o temperatură de la 15 până la 25°C.

Perioada de valabilitate a medicamentului după prima deschidere este utilizat imediat.

## **10. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR**

Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deșeu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu cerințele locale. Solicitați medicului veterinar informații referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste măsuri contribuie la protecția mediului.

## **11. ATENȚIONĂRI SPECIALE (*interdicții*)**

Nu sunt.

## **12. PERIOADA DE VALABILITATE**

3 ani.

A nu se utiliza după expirarea termenului de valabilitate indicat pe ambalaj.

Perioada de valabilitate a medicamentului după prima deschidere este utilizat imediat.

### **13. STATUT LEGAL**

- *se eliberează în baza prescripției veterinare.*

### **14. NATURA ȘI COMPOZIȚIA AMBALAJULUI PRIMAR**

Seringă tub de 19 g, ambalate în pungi de plastic în complet cu catetere și mănuși de unică folosință, în cutii de carton.

### **15. DATA ULTIMEI REVIZUIRI A TEXTULUI**

*04.2020*

NUMAI PENTRU UZ VETERINAR