PROSPECTUL MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

Noroflox 10% soluție orală

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizaţi acest medicament de uz veterinar deoarece conţine informaţii importante pentru dumneavoastră.

- Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi.
- Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului veterinar sau farmacistului.
- Dacă s-au manifestat orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului veterinar, farmacistului veterinar sau Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor
- Acestea includ orice posibile reacţii adverse nemenţionate în acest prospect.

Suplimentar pentru medicamentul de uz veterinar disponibil numai cu prescripţie veterinară:

- Acest medicament de uz veterinar a fost prescris numai pentru animalele dumneavoastră. Nu trebuie să-l daţi altor persoane, care îl pot utiliza greșit.

1. DENUMIREA ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ȘI ALE PRODUCĂTORULUI/FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

Întreprinderea Particulară „OLKAR-AgroZooVet-Service”

str. Eroilor Maidanului (Lenin), 272B, or. Șargorod, reg. Vinița, 23500, Ucraina

tel. / fax: (0432) 55-14-28, (0432) 55-14-27

2. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, CONCENTRAȚIA ȘI FORMA FARMACEUTICĂ ALE ACESTUIA

1 ml de medicament conține substanțe active (mg):

Enrofloxacină 100,0 mg.

Lista excipienților: apă purificată cu hidroxid de potasiu.

3. INDICAȚII TERAPEUTICE *(pe specii ţintă)*

Tratamentul păsărilor bolnave cu rinită infecțioasă aviară, enterită necrozantă, stafilococoză, streptococoză, colibaciloză, pasteureloză, salmoneloză, colibaciloză, infecții cu colibacilare, campilobacterioză,), coriză infecţioasă aviară, pseudomonoză, micoplasmoză și alte boli, sensibile la enrofloxacină.

4. CONTRAINDICAȚII

Nu utilizați la păsări de curte cu sensibilitate crescută la enrofloxacină.

Nu utilizați simultan cu teofilină (eufilină), sucralfat, nitrofurantoină, antacide.

Atunci când sunt combinate cu tetraciclină, macrolide și cloramfenicol (cloramfenicol), pot apărea fenomene antagoniste. Nu utilizați atunci când vacinați cu vaccinul Marek.

Nu prescrieți păsărilor de curte cu tulburări nervoase și tulburări de creștere a cartilajului.

A nu se utiliza la găinile ouătoare ale căror ouă sunt utilizate pentru consumul uman.

5. REACȚII ADVERSE

Efectele secundare asociate produsului medicamentos nu au fost identificate.

Cu toate acestea, utilizarea pe termen lung și dozele mari de enrofloxacină pot provoca tulburări articulare, în special la animalele tineret.

6. SPECII ȚINTĂ

Păsări de curte (pui, pui de carne, curci, gâște, rațe).

7. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, METODA, MODUL DE ADMINISTRARE ȘI DOZA PRESCRISĂ

Oral în doză de 0,10 ml / 1 kg de greutate corporală sau 0,5-1 ml de medicament la 1 litru de apă potabilă timp de 3 zile. În salmoneloză, medicamentul este utilizat timp de 5 zile. Schimbați apa potabilă la fiecare 24 de ore. În timpul tratamentului, păsărilor li se administrează numai apă potabilă care conține Enrofloxacină.

8. PERIOADA DE AȘTEPTARE

Sacrificarea păsărilor pentru carne este permisă după 5 zile de la ultima utilizare a medicamentului. Carnea primită, înainte de perioada specificată, este folosită drept hrană animalelor neproductive, în funcție de concluzia medicului veterinar.

9. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

În loc uscat, ferit de lumină, inaccesibil copiilor, plasat la temperaturi de la +5 pînă la +25 ° C.

10. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR

Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deşeu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu cerinţele locale. Solicitaţi medicului veterinar informaţii referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste măsuri contribuie la protecţia mediului.

11. ATENȚIONĂRI SPECIALE *(interdicţii)*

Utilizarea medicamentului trebuie întreruptă dacă se detectează rezistența microorganismelor la antibiotic. Confirmarea biologică a diagnosticului și un test pentru sensibilitatea microorganismelor la antibiotice trebuie stabilite înainte de prescrierea medicamentului.

Dacă recuperarea nu are loc la trei zile după începerea tratamentului, trebuie înlocuit produsul.

Nu este permisă utilizarea la păsările ouătoare care produc ouă pentru consum uman.

12. PERIOADA DE VALABILITATE

24 luni.

A nu se utiliza după expirarea termenului de valabilitate indicat pe ambalaj.

13. STATUT LEGAL

- *se eliberează în baza prescripției veterinare.*

14. NATURA ȘI COMPOZIȚIA AMBALAJULUI PRIMAR

Fiole de sticlă, câte 1; 2; 5 și 10 ml ambalate în cutii de carton sau flacoane de sticlă de 10, 50; 100; 200; 500; ml și canister de polimer de 1000 , 2000 ml , 5000 ml și 10000 ml .

15. DATA ULTIMEI REVIZUIRI A TEXTULUI

05.2012

NUMAI PENTRU UZ VETERINAR