

PROSPECTUL MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

Trimeroxin comprimate

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament de uz veterinar deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului veterinar sau farmacistului.
- Dacă s-au manifestat orice reacții adverse, adresați-vă medicului veterinar, farmacistului veterinar sau Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor
- Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect.

Suplimentar pentru medicamentul de uz veterinar disponibil numai cu prescripție veterinară:

- Acest medicament de uz veterinar a fost prescris numai pentru animalele dumneavoastră. Nu trebuie să-l dați altor persoane, care îl pot utiliza greșit.

1. DENUMIREA ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ȘI ALE PRODUCĂTORULUI/FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

Întreprinderea Particulară „OLKAR-AgroZooVet-Service”

str. Eroilor Maidanului (Lenin), 272B, or. Șargorod, reg. Vinița, 23500, Ucraina
tel. / fax: (0432) 55-14-28, (0432) 55-14-27

2. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, CONCENTRAȚIA ȘI FORMA FARMACEUTICĂ ALE ACESTUIA

1 comprimat (0,8 g de medicament) conține ingrediente active:

sulfadimetoxină de sodiu -250 mg

trimetoprim – 50 mg

Lista excipienților: zahăr pudră, carboximetilceluloză de sodiu, polivinilpirolidonă, carbonat de calciu, stearat de magneziu, aromă.

3. INDICAȚII TERAPEUTICE (pe specii țintă)

Tratamentul vițelilor (până la vârsta de 3 luni), ovinelor, caprinelor, porcinelor, câinilor și pisicilor pentru bolile sistemului respirator, ale tractului digestiv și ale sistemului genito-urinar cauzate de microorganisme sensibile la trimetoprim și sulfadimetoxină.

Bovine: tratamentul diareei, bronhopneumoniei catarale, eimerozei, colisepticemiei, salmonelozei, pasteurelozei, pneumoniei, abceselor stafilococice cauzate de microorganisme sensibile la trimetoprim și sulfadimetoxină.

Ovine, caprine: tratamentul pasteurelozei, salmonelozei, colisepticemiei, pneumoniei, diareei cauzate de microorganisme sensibile la trimetoprim și sulfadimetoxină.

Porcine: tratamentul pasteurelozei, colienterotoxemiei, gastroenteritei, salmonelozei, coccidiozei, balantidiozei, pleuropneumoniei, dizenteriei cauzate de microorganisme sensibile la trimetoprim și sulfadimetoxină.

Câini și pisici: tratamentul pneumoniei, micoplasmozei, enterocolitei, salmonelozei, pasteurelozei, coccidiozei, izosporozii, endometritei, mastitei cauzate de microorganisme sensibile la trimetoprim și sulfadimetoxină.

4. CONTRAINDICAȚII

A nu se utiliza la animale cu hipersensibilitate la componentele medicamentului, precum și la boli ale organelor hematopoietice, ficat, rinichi.

A nu se utiliza la rumegătoarele cu ventricule dezvoltate funcțional.

A nu se utiliza la animale subnutrite.

A nu se utiliza în prima treime a gestației.

5. REACȚII ADVERSE

Nu sunt.

6. SPECII ȚINTĂ

Viței (până la vârsta de 3 luni), ovine, caprine, porcine, câini și pisici.

7. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, METODA, MODUL DE ADMINISTRARE ȘI DOZA PRESCRISĂ

Oral cu hrana sau cu apă individual sau în grup la dozele indicate în tabel:

Specii de animale	Prima zi	2, 3, 4, 5 zi
Viței (până la vârsta de 3 luni), ovine, caprine (inclusiv animale tinere)	1 comprimat la 5 kg greutate corporală	1 comprimat la 10 kg greutate corporală
Porci, purcei	1 comprimat la 5 kg greutate corporală	1 comprimat la 10 kg greutate corporală
Câini și pisici	1 comprimat la 10 kg greutate corporală	1 comprimat la 20 kg greutate corporală

Medicamentul este administrat o dată pe zi timp de 5-10 zile cu eimerioză, balantidioză, izosporoză. În cazul protozoarelor, tratamentul animalelor se efectuează în două sau trei cure de câte 5 zile fiecare. Intervalul dintre cure este de 5-10 zile.

8. PERIOADA DE AȘTEPTARE

Carne și organe - 10 zile

Lapte – 4 zile.

Carnea primită, înainte de perioada specificată, este folosită drept hrană animalelor neproductive, în funcție de concluzia medicului veterinar.

9. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

În loc uscat, ferit de lumină, inaccesibil copiilor, plasat la temperaturi de la +5 până la +25 ° C.

10. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR

Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deșeu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu cerințele locale.

Solicitați medicului veterinar informații referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste măsuri contribuie la protecția mediului.

11. ATENȚIONĂRI SPECIALE (*interdicții*)

Nu sunt.

12. PERIOADA DE VALABILITATE

Perioada de valabilitate a produsului medicinal veterinar așa cum este ambalat pentru vânzare: 2 ani.

13. STATUT LEGAL

- se eliberează în baza prescripției veterinare.

14. NATURA ȘI COMPOZIȚIA AMBALAJULUI PRIMAR

Blistere nr. 10x1, nr. 10x3 și nr. 10x10 în cutii de carton

15. DATA ULTIMEI REVIZUIRI A TEXTULUI

03.2020

NUMAI PENTRU UZ VETERINAR