

PROSPECTUL MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR TRIMICOZIN

Soluție pentru administrare orală

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament de uz veterinar deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului veterinar sau farmacistului.
- Dacă s-au manifestat orice reacții adverse, adresați-vă medicului veterinar, farmacistului veterinar sau Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor

Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect.
Suplimentar pentru medicamentul de uz veterinar disponibil numai cu prescripție veterinară:

- Acest medicament de uz veterinar a fost prescris numai pentru animalele dumneavoastră. Nu trebuie să-l dați altor persoane, care îl pot utiliza greșit.

1. DENUMIREA ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ȘI ALE PRODUCĂTORULUI/FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

SRL AT Biofarm, Ucraina, or. Harkov 61033, strada Klemenova Dacia, 12, ap.11,
Telefon: +38 (050) 4 061 061; Fax: (057) 73600578;

E-mail: vetbiofarm.vet@gmail.com

2. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, CONCENTRAȚIA ȘI FORMA FARMACEUTICĂ ALE ACESTUIA

1 ml de medicament conține substanțe active:

tilmicosin - 50 mg;

enrofloxacină - 50 mg;

trimetoprim - 25 mg;

Lista excipienților: apă distilată.

3. INDICAȚII TERAPEUTICE

Medicamentul este indicat pentru tratarea bolilor infecțioase ale păsărilor cauzate de microflora bacteriană sensibilă la enrofloxacină, tilmicosin și trimetoprim: micoplasmoză, coliinfecție, salmoneloză, enterită necrozantă, streptococoză, etc.

4. CONTRAINDICAȚII

A nu se utiliza la animale sensibile la componentele medicamentului, precum și la găini ouătoare, ouăle din care sunt destinate alimentației umane. A nu se utiliza concomitent cu antibiotice din grupa tetraciclinei, cloramfenicol, lincomicină. A nu se administra animalelor cu leziuni renale și/sau hepatice.

5. REACȚII ADVERSE

Când se administrează medicamentul în dozele recomandate, nu se observă efecte secundare.

6. SPECII ȚINTĂ

Păsări.

7. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, METODA, MODUL DE ADMINISTRARE ȘI DOZA PRESCRISĂ

Păsări: pe cale orală cu apă de băut în doză de 1-2 ml de medicament la 1 litru apă, timp de 3 zile. În micoplasmoză și ornitobacterioză - 2 ml de medicament la 1 litru apă de băut în primele 3 zile de viață. Se recomandă repetarea tratamentului la păsările de curte în a 20-a-22-a zi de viață, consumând medicamentul timp de 3 zile în doză de 1-2 ml la 1 litru apă de băut.

8. PERIOADA DE AȘTEPTARE

Carne și organe - 12 zile.

Carnea primită înainte de ora specificată este eliminată sau hrănite animalele neproductive, în funcție de concluzia unui medic veterinar.

9. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

Loc uscat, întunecat, inaccesibil copiilor la o temperatură de 5 până la 30 ° C. După dizolvarea medicamentului în apă, această soluție trebuie utilizată în 24 de ore.

10. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR

Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deșeu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu cerințele locale. Solicitați medicului veterinar informații referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste măsuri contribuie la protecția mediului.

11. ATENȚIONĂRI SPECIALE

Medicamentul nu se prescrie în doze subterapeutice și animalelor cu hipersensibilitate la componentele medicamentului. În cazul preparării unei soluții stoc, este necesar să adăugați medicamentul în apă. Apa cu preparatul ar trebui să fie singura sursă de apă potabilă în perioada de tratament!

12. PERIOADA DE VALABILITATE

24 luni.

13. STATUT LEGAL

- *se eliberează în baza prescripției veterinare.*

14. NATURA ȘI COMPOZIȚIA AMBALAJULUI PRIMAR

Cutia conține 10 sticle de polietilenă de 10 ml și sticle de polietilenă de 1000 ml.

15. DATA ULTIMEI REVIZUIRI A TEXTULUI

01.2023

NUMAI PENTRU UZ VETERINAR