

PROSPECTUL MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

Kubatol® pix
spray

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament de uz veterinar deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului veterinar sau farmacistului.
- Dacă s-au manifestat orice reacții adverse, adresați-vă medicului veterinar, farmacistului veterinar sau Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor

Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect.
Suplimentar pentru medicamentul de uz veterinar disponibil numai cu prescripție veterinară:

- Acest medicament de uz veterinar a fost prescris numai pentru animalele dumneavoastră. Nu trebuie să-l dați altor persoane, care îl pot utiliza greșit.

1. DENUMIREA ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ȘI ALEPRODUCĂTORULUI/FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

AVEFLOR, a.s., Budčeves 26, 507 32 Kopidlno, Republica Cehă, CUI: 64259838
www.aveflor.cz Tel.: +420.493.551.111 Fax: +420.493.551.112

E-mail: jakost@aveflor.cz

2. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, CONCENTRAȚIA ȘI FORMA FARMACEUTICĂ ALE ACESTUIA

100 g de medicament conține ingrediente active (g):

Gudron de fag - 4,6 g.

Lista excipienților: Dimetil eter, etanol denaturat, copolimer acrilic, etil acetat.

3. INDICAȚII TERAPEUTICE (pe specii țintă)

Kubatol® Pix spray este indicat la animalele agricole și animalele de companie (cu excepția pisicilor) pentru diferite leziuni ale pielii, cum ar fi afecțiunile copitei și ghearelor, în cazul în care este indicat tratamentul cu gudron, chirurgia copitei, tratamentul afecțiunilor copitei, tratament după curățarea regulată a copitelor, fixarea bandajelor și pansamentelor la nivelul copitei. Dermatomicoze la animale, în special în stadiile incipiente sau în timpul terapiei secvențiale, atunci când proprietățile de uscare are gudronului au un efect favorabil.

Tratament – psoriasis vulgaris, dermatită atopică lichenificată, lichen simplex chronicus, lichen planus, dermatită seboreică.

Înlocuirea bandajului din țesătură; după evaporarea solventului se formează o

peliculă antiadezivă maro, care respinge apa. Gudronul are proprietăți de uscare avantajoase.

4. CONTRAINDICAȚII

Nu se utilizează în caz de hipersensibilitate la substanțele active sau la oricare dintre excipienți. Este interzisă aplicarea Kubatol® Pix Aerosol pe pisici, precum și aplicarea pe răni cu sângerări severe, umede și deschise.

5. REACȚII ADVERSE

Nu sunt.

6. SPECII ȚINTĂ

Bovine, caprine, ovine, cabaline și câini.

7. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, METODA, MODUL DE ADMINISTRARE ȘI DOZA PRESCRISĂ

Aplicarea topică externă. Înainte de a fi aplicat, curățați zona afectată de corpuri străini, exudat, țesuturi necrotizate.

Agitați bine înainte de utilizare. Flaconul trebuie să fie păstrate în poziție verticală. Produsul este aplicat prin apăsarea spray-ului, la o distanță de 8 - 12 cm de la suprafața plăgii, pulverizați de 5 ori (doza 0,5 ml) la flaconele cu volum cuprins 50-200 ml sau 1 pulverizare (doza de 0,5 ml) la flacoanele în volum de 500 ml. Se aplică la fiecare 12 ore până la recuperare completă a animalului.

Agitați bine înainte de utilizare. Aplicați prin pulverizare de la o distanță de 15–20 cm, evitați scurgerea inutilă. La tratarea ghearelor și a copitelor este de preferat să se creeze 2-3 straturi (aplicați următorul strat doar după ce stratul anterior s-a uscat complet).

Folosirea produsului nu afectează starea generală de sănătate a animalelor în timpul gestației, datorită zonei relativ mici de aplicare

Aplicarea topică externă. Înainte de aplicarea medicamentului, se recomandă curățarea suprafeței tratate de puroi, exudat, țesut necrotic, îndepărtarea părului. Kubatol® Pix spray se pulverizează pe zona afectată timp de 1-2 secunde, ținând flaconul vertical la o distanță de 15-20 cm de suprafața tratată. După aplicarea medicamentului, pe zona afectată se formează un strat, când stratul se usucă, medicamentul este reaplicat în 2-3 straturi. Durata tratamentului este de la 3 la 8 zile, în funcție de severitatea leziunii și de rata de vindecare a suprafeței tratate. Manipularea animalelor trebuie efectuată într-o zonă bine ventilată. Când tratați leziuni în zona capului, evitați introducerea medicamentului în ochi.

8. PERIOADA DE AȘTEPTARE

Nu este cazul.

9. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

Depozitați în ambalajul închis al producătorului, într-un loc uscat, ferit de lumina directă a soarelui, separat de alimente și furaje, la o temperatură de 10 ° C până la 25 ° C. Încălzirea cilindrului peste 50°C nu este permisă.

A nu se păstra cu alimente, băuturi și hrana pentru animale.

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

10. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR

Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deșeu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu cerințele locale.

Solicitați medicului veterinar informații referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste măsuri contribuie la protecția mediului.

11. ATENȚIONĂRI SPECIALE (*interdicții*)

A nu se administra în jurul ochilor.

A se utiliza într-o locație bine ventilată.

Numai pentru uz extern.

12. PERIOADA DE VALABILITATE

24 luni. A nu se utiliza după expirarea termenului de valabilitate indicat pe ambalaj.

Perioada de valabilitate a produsului medicinal veterinar după prima deschidere a ambalajului primar: 1 an

13. STATUT LEGAL

- *se eliberează în baza prescripției veterinare.*

14. NATURA ȘI COMPOZIȚIA AMBALAJULUI PRIMAR

Flacoane din sticlă și/sau polimer cu pulverizator a câte 50, 100, 200 și 500 ml.

15. DATA ULTIMEI REVIZUIRI A TEXTULUI

12.2019

NUMAI PENTRU UZ VETERINAR