

PROSPECTUL MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR
DEZI SPRAY
soluție pentru uz extern

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament de uz veterinar deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului veterinar sau farmacistului.
- Dacă s-au manifestat orice reacții adverse, adresați-vă medicului veterinar, farmacistului veterinar sau Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor

Acestea includ orice posibile reacții adverse nementionate în acest prospect.
Suplimentar pentru medicamentul de uz veterinar disponibil numai cu prescripție veterinară:

- Acest medicament de uz veterinar a fost prescris numai pentru animalele dumneavoastră. Nu trebuie să-l dați altor persoane, care îl pot utiliza greșit.

1. DENUMIREA ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ȘI ALE PRODUCĂTORULUI/FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

Întreprinderea Particulară „OLKAR-AgroZooVet-Service”, str. Eroilor Maidanului (Lenin), 272B, or. Șargorod, reg. Vinița, 23500, Ucraina . tel. / fax: (0432) 55-14-28, (0432) 55-14-27.

2. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, CONCENTRAȚIA ȘI FORMA FARMACEUTICĂ ALE ACESTUIA

100 ml de medicament conține ingrediente active (g):

Clorhidrat de oxitettraciclină - 2,5

Violet de gențiană - 0,5

Lista excipienților: polisorbat 80, glicerină, alcool izopropilic, apă distilată.

3. INDICAȚII TERAPEUTICE (pe specii țintă)

Indicat la câini și pisici: în tratamentul plăgilor traumatice și chirurgicale (inclusiv după castrare, amputarea urechilor sau cozilor), dermatită interdigitală, piodermite, eczeme, zgâriere, mușcături, contuzii, ulcere și abcese deschise de diferite etiologii sensibile la oxitettraciclină.

4. CONTRAINDICAȚII

Nu se utilizează în caz de hipersensibilitate la substanțele active sau la oricare dintre excipienți.

5. REACȚII ADVERSE

Nu sunt.

6. SPECII ȚINTĂ

Câini și pisici.

7. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, METODA, MODUL DE ADMINISTRARE ȘI DOZA PRESCRISĂ

Aplicarea topică externă. Înainte de a fi aplicat, curățați zona afectată de corpii străini, exudat, țesuturi necrotizate.

Agitați bine înainte de utilizare. Flaconul trebuie să fie păstrate în poziție verticală. Produsul este aplicat prin apăsarea spray-ului, la o distanță de 8 - 12 cm de la suprafața plăgii, pulverizați de 5 ori (doza 0,5 ml) la flaconele cu volum cuprins 50-200 ml sau 1 pulverizare (doza de 0,5 ml) la flacoanele în volum de 500 ml. Se aplică la fiecare 12 ore până la recuperare completă a animalului.

8. PERIOADA DE AȘTEPTARE

Nu este cazul.

9. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

În loc uscat, ferit de lumină, inaccesibil copiilor, plasat la temperaturi de la +5 până la +25 ° C.

A nu se păstra cu alimente, băuturi și hrana pentru animale.

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

10. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR

Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deșeu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu cerințele locale. Solicitați medicului veterinar informații referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste măsuri contribuie la protecția mediului.

11. ATENȚIONĂRI SPECIALE (*interdicții*)

A nu se administra în jurul ochilor.

A se utiliza într-o locație bine ventilată.

Numai pentru uz extern.

12. PERIOADA DE VALABILITATE

24 luni. A nu se utiliza după expirarea termenului de valabilitate indicat pe ambalaj.

Perioada de valabilitate a produsului medicinal veterinar după prima deschidere a ambalajului primar: 1 an

13. STATUT LEGAL

se eliberează în baza prescripției veterinare.

14. NATURA ȘI COMPOZIȚIA AMBALAJULUI PRIMAR

Flacoane din sticlă și/sau polimer cu pulverizator a câte 50, 100, 200 și 500 ml.

15. DATA ULTIMEI REVIZUIRI A TEXTULUI

12.2019

NUMAI PENTRU UZ VETERINAR