

PROSPECTUL MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

Iodoform 5% pulbere pentru răni

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament de uz veterinar deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului veterinar sau farmacistului.
- Dacă s-au manifestat orice reacții adverse, adresați-vă medicului veterinar, farmacistului veterinar sau Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor
- Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect.

1. DENUMIREA ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ȘI ALE PRODUCĂTORULUI/FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

Întreprinderea Particulară „OLKAR-AgroZooVet-Service” str. Eroilor Maidanului (Lenin), 272B, or. Șargorod, reg. Vinița, 23500, Ucraina
tel. / fax: (0432) 55-14-28, (0432) 55-14-27

2. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, CONCENTRAȚIA ȘI FORMA FARMACEUTICĂ ALE ACESTUIA

Substanțe active:

1 g de medicament conține substanțe active:

Iodoform - 50 mg;

Streptocid - 50 mg;

Oxid de zinc - 50 mg;

Lista excipienților: talc, amidon (porumb sau cartofi).

3. INDICAȚII TERAPEUTICE

Extern pentru tratamentul: bovinelor, cabalinelor, ovinelor, caprinelor, porcinelor, câinilor și pisicilor cu răni infectate și postoperatorii, ulcere, fistule, eczeme umede, dermatite, tendovaginite, flegmon, limfadenite, plăgi cu vindecare îndelungată.

4. CONTRAINDICAȚII

A nu se utiliza în caz de sensibilitate individuală crescută (alergie) la medicament.

5. REACȚII ADVERSE

La administrarea conform instrucțiunii, reacții adverse nu sunt.

6. SPECII ȚINTĂ

Bovine, cabaline, ovine, caprine, porcine, câini și pisici.

7. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, METODA, MODUL DE ADMINISTRARE ȘI DOZA PRESCRISĂ

Extern. Înainte de aplicare, zona afectată este curățată de lână, corpi străini, exudat, țesuturi necrotizate. Se pudrează zonele afectate ale pielii cu medicament (1-2 g la 5 cm² din zona afectată) și 2 - 4 cm în jurul lor. Zonele afectate sunt tratate de 1-2 ori pe zi. Tratamentele repetate se efectuează conform indicațiilor chirurgicale.

8. PERIOADA DE AȘTEPTARE

Nu este cazul.

9. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A se păstra la loc uscat, întunecat, inaccesibil copiilor, la o temperatură de la 4 până la 35°C și o umiditate relativă de cel mult 70%. A se păstra departe de alimente, băuturi, inclusiv și hrana animalelor .

10. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR

Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deșeu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu cerințele locale. Solicitați medicului veterinar informații referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste măsuri contribuie la protecția mediului.

11. ATENȚIONĂRI SPECIALE

Nu sunt.

12. PERIOADA DE VALABILITATE

36

luni.

A nu se utiliza după expirarea termenului de valabilitate indicat pe ambalaj.

13. STATUT LEGAL

- se eliberează fără prescripție veterinară.

14. NATURA ȘI COMPOZIȚIA AMBALAJULUI PRIMAR

Pungi laminate de 5, 10, 500 g, flacoane de polimer de 30, 40, 50, 100 g, saci de polimer de 10, 20 kg.

15. DATA ULTIMEI REVIZUIRI A TEXTULUI

11.2022

NUMAI PENTRU UZ VETERINAR