

PROSPECTUL MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

Albendazol 10% suspensie

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament de uz veterinar deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului veterinar sau farmacistului.
- Dacă s-au manifestat orice reacții adverse, adresați-vă medicului veterinar, farmacistului veterinar sau Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor
- Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. *Suplimentar pentru medicamentul de uz veterinar disponibil numai cu prescripție veterinară:*
- Acest medicament de uz veterinar a fost prescris numai pentru animalele dumneavoastră. Nu trebuie să-l dați altor persoane, care îl pot utiliza greșit.

1. DENUMIREA ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ȘI ALE PRODUCĂTORULUI/FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR
Întreprinderea Particulară „OLKAR-AgroZooVet-Service” str. Eroilor Maidanului (Lenin), 272B, or. Șargorod, reg. Vinița, 23500, Ucraina .tel. / fax: (0432) 55-14-28, (0432) 55-14-27

2. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, CONCENTRAȚIA ȘI FORMA FARMACEUTICĂ ALE ACESTUIA

1 ml de medicament conține substanțe active (mg):

Albendazol - 100 mg.

Lista excipienților: tiloză, polisorbitol-80, apă purificată.

3. INDICAȚII TERAPEUTICE

Deparazitarea bovinelor, ovinelor și caprinelor de nematode gastrointestinale și pulmonare, cestodoze și trematode:

Bovine, ovine, caprine:

- nematode pulmonare și gastrointestinale - haemonhuses (*Haemonchus placei*, *H. contortus*), nematode (*Nematodirus filicollis*, *N. spathiger*), habertioză (*Chabertia ovina*), bunostomoză (*Bunostomum trigonocephalum*, *B.phlebotom vengo*), (*Oesophagostomum columbianum*, *O. radiatum*, *O. venulosum*), trichuroza (*Trichuris ovis*, *T. skrjabini*), strongiloidoză (*Strongyloides papillosus*), dictiocauloză (*Dictyocaulus filaria*, *D. viviparus*)
- cestodoze – moniesioz (*Moniezia expansa*, *M. benedeni*), tizaniezios (*Thysaniezia giardi*)
- trematode - fasciolioză (*Fasciola hepatica*), dicrocelioză (*Dicrocoelium dendriticum*).

4. CONTRAINDICAȚII

A nu se administra animalelor bolnave și subnutrite, bolnave de boli infecțioase.

5. REACȚII ADVERSE

La animalele sensibile la benzimidazol, sunt posibile complicații: reacții alergice (erupții cutanate, mâncărime, umflături), afectarea circulației sângelui.

6. SPECII ȚINTĂ

Bovine, ovine și caprine.

7. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, METODA, MODUL DE ADMINISTRARE ȘI DOZA PRESCRISĂ

Medicamentul este administrat animalelor numai individual, oral, în următoarele doze:

<i>Specia de animal</i>	<i>Tipul de helminți</i>	<i>Cantitatea de preparat</i>	
-------------------------	--------------------------	-------------------------------	--

		<i>medicamentos ml/10 kg masa vie</i>	<i>Metoda de administrare</i>
Bovine	Nematode, cestode	0,75	O singură administrare, în trichuroză - de două ori, cu interval de 24 de ore.
	Trematode (fasciolioză cronică)	1	
Ovine, caprine	Nematode, cestode	0,5	O singură administrare
	Trematode (fasciolioză cronică)	0,75	
	Dicrocelioză cronică		
	Dicrocelioză cronică	1,5	

O dietă specială și laxative nu se va utiliza înainte de deparazitare. Agitați bine flaconul cu medicamentul înainte de utilizare.

Pentru rumegătoare, medicamentul este administrat folosind un seringă-dozator, pentru alte tipuri de animale, medicamentul este amestecat cu furaje umede.

Înainte de tratamentele în masă, fiecare lot de medicament este testat preliminar pe un număr mic dintr-un grup de animale (5-7 capete) cu diferită masă corporală în dozele recomandate. Dacă nu au fost observate semne de complicații la animale în decurs de două zile, atunci medicamentul este utilizat pentru întregul șeptel.

Deparazitarea preventivă se efectuează înainte de programul de vaccinare și animalele nou sosite; la animale la 1,5 luni după intrarea în pășune și la fiecare 1,5 luni; bovine adulte în toamnă înainte de a fi transferate în grajduri.

Dacă este necesar, terapia pentru fasciolioză la rumegătoare, medicamentul este utilizat în orice moment al anului. Având în vedere că albendazolul este inefficient împotriva formelor tinere de fasciole, prima deparazitare preventivă se efectuează la 2-2,5 luni după sfârșitul perioadei de pășunat și a doua - cel târziu cu 10-15 zile înainte de a ieși la pășune.

8. PERIOADA DE AȘTEPTARE

După ultima utilizare a medicamentului, este permisă sacrificarea animalelor pentru carne: bovine, ovine, caprine - după 14 zile.

Laptele poate fi consumat după 4 zile după ultima utilizare a medicamentului.

În cazul sacrificării forțate a animalelor, carnea poate fi folosită ca hrană pentru carnivore sau pentru producerea de carne și făină de oase, iar laptele poate fi utilizat pentru consumul la animalele neproductive.

9. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

În loc uscat, ferit de lumină, inaccessibil copiilor, plasat la temperaturi de la +5 până la +25 ° C.

10. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR

Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deșeu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu cerințele locale. Solicitați medicului veterinar informații referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste măsuri contribuie la protecția mediului.

11. ATENȚIONĂRI SPECIALE (interdicții)

Nu utilizați în fascioliază acută!

A nu se utiliza la animale în prima treime a gestației și în timpul monei.

12. PERIOADA DE VALABILITATE*36 luni.*

Perioada de valabilitate a produsului medicinal veterinar după prima deschidere a ambalajului primar: 3 luni. A nu se utiliza după expirarea termenului de valabilitate indicat pe ambalaj.

13. STATUT LEGAL

- *se eliberează în baza prescripției veterinare.*

14. NATURA ȘI COMPOZIȚIA AMBALAJULUI PRIMAR

Flacoane din polimer de 10, 50, 100 ml, canistre de 1 litru și 5 litri.

15. DATA ULTIMEI REVIZUIRI A TEXTULUI

20.02.2020

NUMAI PENTRU UZ VETERINAR