

Arpalit Neo spray, soluție ectoparazitară

1. NUMELE ȘI ADRESA TITULARULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ ȘI A TITULARULUI AUTORIZAȚIEI DE FABRICAȚIE RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA LOTULUI, DACĂ ACESTEA NU SUNT IDENTICE

AVEFLOR, a.s., Budčeves 26, 507 32 Kopidlno, Republica Cehă

CUI: 64259838

www.aveflor.cz

2. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

Arpalit Neo spray, soluție ectoparazitară

Permethrinum 25:75 (cis:trans)

Fenoxycarbum

3. CONȚINUTUL DE SUBSTANȚE MEDICAMENTOASE ȘI DE ALTE SUBSTANȚE

1 gram (1,34 ml) conține:

Substanțe medicamentoase:

Permethrinum 25:75 (cis:trans) 4,7 mg

Fenoxycarbum 1,2 mg

Spray cutanat, soluție.

Soluție incoloră

4. INDICAȚII

Tratamentul ectoparazitozelor la animalele nealimentare. Produsul acționează împotriva puricilor (*Ctenocephalides* spp.), căpușelor (*Ixodes* spp., *Dermacentor* spp., *Haemaphysalis* spp.), păduchilor (*Linognathus setosus*, *Haematopinus* spp.), păduchilor malofagi (*Trichodectes canis*, *Mallophaga* spp), acarienilor (*Acari* spp.) și a stadiilor de dezvoltare ale acestora.

Produsul poate fi utilizat pentru dezinfectarea adăposturilor pentru animale.

5. CONTRAINDICAȚII

A nu se utiliza la animalele bolnave.

A nu se utiliza la pisici. Evitați un eventual contact între pisici și animale după tratament.

A nu se utiliza la animalele tinere cu vârsta sub 2 luni.

A nu se utiliza în caz de hipersensibilitate cunoscută la oricare dintre substanțe conținute.

A nu se aplica pe pielea vătămată.

6. REACȚII ADVERSE

Doar rareori exemplarele hipersensibile pot prezenta simptome de intoxicație (alterarea calității sau pierderea părului, vărsături, convulsii, tremurături, spasm, tulburări de mers, activitate crescută, letargie, salivă crescută, diaree sau incontinență urinară, febră sau dimpotrivă scăderea temperaturii, tulburări respiratorii, pierderea orientării). În caz de reacții adverse sau alte reacții neobișnuite, îmbăiați imediat animalul (folosiți un șampon fără substanțe insecticide) și consultați un medic veterinar.

Dacă observați orice reacții adverse grave sau alte reacții care nu sunt enumerate în acest prospect, vă rugăm să vă anunțați aceasta medicului veterinar.

7. SPECII DE ANIMALE VIZATE

Câini și mamifere mici - iepuri, cobai, șobolani și hamsteri.

8. DOZE PENTRU FIECARE SPECIE, CALEA (CĂILE) ȘI MODUL DE ADMINISTRARE

Modul de administrare: Administrare cutanată

Produsul se aplică prin apăsarea pulverizatorului pe direcția blănii, de la o distanță de 15-20 cm de suprafața corpului. Mărimea dozei depinde de mărimea animalului tratat și de lungimea și densitatea blănii acestuia. Doza recomandată de Permethrin: 15 mg/kg greutate vie.

Se recomandă ca un animal de 10 kg să fie tratat cu o aplicare care durează în total 50 de secunde (până când blana sau pielea este ușor umezită), adică un ambalaj de 150 ml este suficient pentru un animal cu o greutate de 35 kg.

Tratamentul se efectuează pe întreaga suprafață a corpului animalului, cu excepția capului (în jurul ochilor, botul). Pentru a trata capul, pulverizați produsul în palma unei mâini protejate cu o mănușă și frecați ușor pe blană pentru a evita contactul cu orificiile nazale și cu ochii. Pieptănați blana tratată cu un pieptene, o perie sau frecați-o cu mâna pentru ca produsul să pătrundă până la piele. După tratament, animalul nu trebuie spălat timp de 48 de ore.

Produsul ucide puricii și căpușele și induce protecție împotriva unei noi invazii timp de până la patru săptămâni. Tratamentul poate fi repetat cel mai devreme după o săptămână. În cazul utilizării produsului împotriva păduchilor și acarienilor, se recomandă repetarea aplicării după 1-2 săptămâni.

La tratarea mamiferelor mici trebuie să se acorde o atenție sporită și să se evite supradozarea.

9. INSTRUCȚIUNI PENTRU ADMINISTRAREA CORECTĂ

Agitați înainte de utilizare. Recipientul trebuie să fie ținut în poziție verticală.

10. PERIOADA (PERIOADELE) DE PROTECȚIE

Nu este destinat animalelor destinate consumului uman.

11. MĂSURI SPECIALE DE DEPOZITARE

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

A se păstra la temperaturi de până la 25 °C. Recipientul este sub presiune: a se feri de lumina soarelui sau de temperaturi de peste 50 °C. A se păstra departe de sursele de aprindere - Fumatul interzis.

Nu utilizați acest medicament de uz veterinar după data de expirare menționată pe recipient.

12. AVERTIZARE SPECIALĂ

Rezistența paraziților la orice grup de ectoparaziticide se poate dezvolta după utilizarea frecventă și repetată a unei substanțe active din același grup.

Precauții speciale pentru utilizare la animale

După aplicarea produsului, împiedicați animalul să lingă blana tratată.

La aplicare, este necesar să se protejeze ochii și nările animalului împotriva jetului de spray. Puricii pot fi prezenți și în locurile în care animalele dorm sau se odihnesc (covoare, preșuri etc.). Aceste locuri trebuie să fie aspirate în mod regulat și tratate cu produse insecticide adecvate, cum ar fi acest produs.

Măsuri specifice pentru persoanele care administrează un medicament de uz veterinar la animale

Utilizați produsul în spații bine ventilate.

Persoanele cu hipersensibilitate cunoscută la permetrină trebuie să evite contactul cu produsul medicinal veterinar.

Produsul poate provoca iritarea ochilor, a pielii, a mucoaselor sau a căilor respiratorii și, la persoanele hipersensibile, o reacție alergică a pielii. Evitați inspirarea și contactul pielii, ochilor și a mucoaselor cu produsul. Folosiți echipament individual de protecție, în special mănuși sau ochelari de protecție, atunci când manipulați cu produsul medicinal veterinar. În plus, în cazul aplicațiilor repetate sau prelungite (de exemplu, utilizarea pe un număr mare de animale), trebuie să se utilizeze îmbrăcăminte de protecție cu mâneci lungi, eventual un aparat respirator.

În cazul contaminării pielii sau a mucoaselor, clătiți imediat cu o cantitate mare de apă. În caz de contact cu ochii, spălați cu o cantitate mare de apă potabilă. Dacă apar simptome de iritație sau reacție alergică (înroșire, mâncărime, erupție cutanată, durere, lăcrimare a ochilor, umflarea conjunctivei etc.) sau efecte sistemice, solicitați asistență medicală.

Dacă apar simptome de iritație sau reacție alergică (înroșire, mâncărime, erupție cutanată, durere, lăcrimare a ochilor, umflarea conjunctivei etc.) sau efecte sistemice, solicitați asistență medicală.

Nu mâncați, nu beți și nu fumați atunci când manipulați cu produsul.

După utilizare, spălați-vă pe mâini cu apă și săpun și, dacă este necesar, spălați și locul unde a fost aplicat produsul pe animal (masă, podea etc.).

Produsul nu trebuie să intre în contact direct cu alimente, apă potabilă și jucării pentru copii.

Produsul medicinal veterinar nu trebuie administrat de către femeile însărcinate și care alăptează.

Nu pulverizați sprayul în foc deschis sau pe orice material încins.

Nu manipulați cu animalele tratate și nu permiteți copiilor să se joace cu ele până când locul de aplicare nu este uscat, timp de cel puțin 24 de ore după aplicare. Prin urmare, se recomandă să nu se trateze animalele în timpul zilei, ci la începutul serii, și să nu se permită animalelor proaspăt tratate să doarmă cu proprietarii lor, în special cu copii.

Alte măsuri:

Produsul este foarte toxic pentru organismele acvatice. Animalele tratate trebuie să fie împiedicate să înoate în apele curgătoare timp de 2 zile după tratament.

Sarcina și alăptarea

Studiile toxicologice cu Permethrin și Fenoxycarb nu au arătat efecte nocive asupra reproducerii sau dezvoltării descendenților la animale. În timpul sarcinii și alăptării, produsul poate fi utilizat după evaluarea beneficiilor terapeutice și a riscurilor de către medicul veterinar competent.

Interacțiuni

Nu utilizați acest preparat împreună cu alte preparate care conțin piretroizi și organofosfați.

Supradozare

La supradozare poate crește riscul de reacții adverse (a se vedea punctul 6).

În caz de supradozare, începeți tratamentul simptomatic adecvat.

Incompatibilități

Nu sunt cunoscute.

13. MĂSURI SPECIALE DE ELIMINARE A PREPARATELOR NEUTILIZATE SAU A DEȘEURILOR, DACĂ ESTE NECESAR

Întregul produs medicinal veterinar neutilizat sau deșeurile derivate din acest produs trebuie eliminate în conformitate cu legislația locală. Produsul nu trebuie să contamineze cursurile de apă, deoarece poate fi periculos pentru pești și alte organisme acvatică. Nu contaminați iazurile, cursurile de apă sau canalele de scurgere cu produsul sau cu ambalajele goale.

14. DATA ULTIMEI REVIZUIRI A PROSPECTULUI

15. ALTE INFORMAȚII

Doar pentru animale.

Fără prescripție.

16. NUMĂR DE ÎNREGISTRARE

2819

17. DATA EXPIRĂRII

Exp: {luna/anul}

18. NUMĂRUL LOTULUI PRODUCĂTORULUI

Numărul lotului: {numărul}

19. MĂRIMEA AMBALAJULUI

150 ml (112 g)

300 ml (224 g)