

PROSPECT

Spray insecto-acaricid Burdi fipro, 3 mg/ml - pentru uz extern, câini și pisici

1.DENUMIREA ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ȘI ALE PRODUCĂTORULUI/FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, DACĂ SUNT DIFERITE

Întreprinderea Particulară „OLKAR-AgroZooVet-Service”
str. Eroilor Maidanului (Lenin), 272B, or. Șargorod, reg. Vinița, Ucraina,
23500, tel.: +38 (043) 442-12-54, fax: +38 (043) 442-17-87
e-mail: vet@olkar.com.ua, www.agroolkar.com.ua

2.DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

Spray insecto-acaricid Burdi fipro, 3 mg/ml - pentru uz extern, câini și pisici.

3.DECLARAREA (SUBSTANȚEI) SUBSTANȚELOR ACTIVE ȘI A ALTOR INGREDIENTE (INGREDIENTI)

1 ml de medicament conține substanța activă (mg):

Fipronil - 3,0 mg.

Excipienți: alcool izopropilic, glicerină, ulei de ricină, acid citric, aromatizator, apă distilată.

4.INDICAȚIE TERAPEUTICE

Prevenirea și tratamentul ectoparaziților la câini și pisici: purici (Ctenocephalus spp.), Păduchi (Linognathus setosus), malofage în stadiile de dezvoltare imaginală și larvară (Trichodectes spp.), Parasitiphornim și acarienii scabiei (Dermacentor spp., Ixodes), Rhipicephalus spp.), acarieni acariformi (Sarcoptidae, Psoroptidae).

Preparatul este eficient în scabia auriculară a carnivorelor - otodectoză (Otodectes cynotis).

5.CONTRAINDICAȚII

A nu se utiliza la animale bolnave sau istovite!

A nu se administra la căței și pisoi sub vârsta de 10 săptămâni, câini cu masa corporală sub un kg!

A nu se utiliza la animale sensibile la componentele medicamentului.

6.REACȚII ADVERSE

Nu sunt.

7.SPECII ȚINTĂ

Câini, pisici.

8. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE DE ADMINISTRARE ȘI MOD DE ADMINISTRARE

Preparatul se aplică extern. Înainte de a trata animalul, se agită bine flaconul cu spray, se direcționează jetul de medicament pe corpul animalului de la o distanță de 10-15 cm, pulverizând 0,5 ml. Când se pulverizează, flaconul cu medicamentul se menține în poziție verticală. Se aplică medicamentul împotriva blănnii; animalele cu păr lung, înainte de tratament, se peaptănă cu o perie și preparatul se aplică contra firelor de păr, astfel, încât să ajungă pe piele. În cazul infestării cu scabie, păduchi, malofagoză, tratamentul se efectuează de 2-3 ori cu un interval de 10-12 zile. Tratamentul animalelor se efectuează în timpul activității sezoniere a paraziților, dar și în cazuri de necesitate.

Pentru a preveni infestarea animalelor de către ectoparaziți, este necesar să schimbați periodic așternutul sau să îl tratați, inclusiv și articolele de îngrijire a animalelor în doză de 2 ml de spray pe 1 m².

În tratamentul otodectozei (scabia la ureche), canalul auditiv inițial se curăță de ceară, exudat și cruste, ulterior se instilează 0,5 ml de medicament în fiecare ureche. Pentru a distribui uniform medicamentul, închideți canalul auricular și masați ușor, fixând capul animalului timp de 5-10 minute pentru a preveni eliminarea medicamentului. Preparatul este instilat în ambele urechi, necătînd la afecțiunea numai unei urechi.

Împotriva căpușelor ixodide de pe corpul animalelor, medicamentul trebuie aplicat în doză de 0,5 ml direct pe căpușă și pe locul atașării acesteia pe piele. Dacă căpușa nu cade singură în 30 de minute, trebuie îndepărtată cu grijă cu o pincetă și distrusă.

9.RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ

Se aplică medicamentul împotriva blănnii; animalele cu păr lung, înainte de tratament, se peaptănă cu o perie și preparatul se aplică contra firelor de păr, astfel, încât să ajungă pe piele.

10. PERIOADA DE AȘTEPTARE

Nu este cazul.

11. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

La loc uscat, ferit de lumină, la o temperatură de +2 până la +25°C.

A nu se păstra împreună cu alimente, băuturi sau hrana animalelor.

12. ATENȚIONĂRI SPECIALE

A nu se utiliza la femele în timpul perioadei de gestație și alăptare!

Tratamentul animalelor cu medicamentul trebuie efectuat în aer liber sau în încăperi bine ventilate, păstrînd animalele pînă cînd blana este complet uscată. Este interzis consumul de hrană, apă, de fumat în timpul prelucrării animalelor. Se interzice aplicarea spreuiului pe mucoase și intern. Spălați-vă bine mîinile cu săpun și apă caldă după manipulare. Este interzisă îmbăierea și atingerea animalelor în decurs de 48 de ore după tratament. Se evită linsul de către animal a medicamentului de pe piele după tratament. În caz de supradozaj, utilizați sulfat de atropină ca antidot în doze terapeutice și tratament simptomatic.

13. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR

Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deșeu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu cerințele locale. Solicitați medicului veterinar informații referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste măsuri contribuie la protecția mediului.

14. DATE ÎN BAZA CĂRORA A FOST APROBAT ULTIMA DATĂ PROSPECTUL

01.2023

15. ALTE INFORMAȚII>

Nu toate dimensiunile de ambalaje pot fi comercializate.

Pentru orice informații referitoare la acest medicament de uz veterinar, vă rugăm să contactați reprezentantul local al deținătorului certificatului de înregistrare.