

PROSPECTUL MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

Spray INSECTOL

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament de uz veterinar deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului veterinar sau farmacistului.
- Dacă s-au manifestat orice reacții adverse, adresați-vă medicului veterinar, farmacistului veterinar sau Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor

Acestea includ orice posibile reacții adverse nementionate în acest prospect.
Suplimentar pentru medicamentul de uz veterinar disponibil numai cu prescripție veterinară:

- Acest medicament de uz veterinar a fost prescris numai pentru animalele dumneavoastră. Nu trebuie să-l dați altor persoane, care îl pot utiliza greșit.

1. DENUMIREA ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ȘI ALE PRODUCĂTORULUI/FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

Întreprinderea Particulară „OLKAR-AgroZooVet-Service”, str. Eroilor Maidanului (Lenin), 272B, or. Șargorod, reg. Vinița, 23500, Ucraina
tel. / fax: (0432) 55-14-28, (0432) 55-14-27

2. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, CONCENTRAȚIA ȘI FORMA FARMACEUTICĂ ALE ACESTUIA

1 ml de preparat conține substanța activă:

Deltametrin - 0,25 mg.

Lista excipienților: alcool izopropilic, ulei de ricin, apă distilată.

3. INDICAȚII TERAPEUTICE (pe specii țintă)

Tratamentul și prevenirea infectării cu ectoparaziți a câinilor și a pisicilor:

- purici (*Ctenocephalus canis*, *Ctenocephalus felis*);
- păduchi (*Linognathus setosus*);
- malofagi (*Trichodectes canis*, *Felicola subrostratus*);
- acarienii scabiei (*Otodectes spp.*);
- căpușe parazitiforme (ixodide) (*Dermacentor pictus*, *Dermacentor marginatus*, *Rhipicephalus sanguineus*, *Ixodes ricinus*).

4. CONTRAINDICAȚII

A nu se prelucra animalele bolnave și lihnite, animalele în perioada de gestație și alăptare, cățele și pisicile cu vârsta de până la 8 săptămâni, precum și animalele sensibile la componentele preparatului.

5. REACȚII ADVERSE

Nu sunt.

6. SPECII ȚINTĂ

Câini și pisici.

7. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, METODA, MODUL DE ADMINISTRARE ȘI DOZA PRESCRISĂ

Extern. Preparatul se aplică pe blana și pielea animalelor prin pulverizare timp de câteva secunde împotriva sensului de creștere a părului până la o ușoară umezire a blănii. În funcție de gradul de infectare cu ectoparaziți prelucrarea repetată se efectuează peste 10-14 zile.

Doza de preparat constituie:

pisici: 0,8 ml de preparat (6 pulverizări);

căței și pisici mici: 0,4 ml de preparat (3 pulverizări);

câini: cu greutatea corporală 2-10 kg - 0,8 ml de preparat (6 pulverizări);

cu greutatea corporală 10-20 kg - 1,6 ml de preparat (12 pulverizări);

cu greutatea corporală 20-40 kg - 2,4 ml de preparat (18 pulverizări);

cu greutatea corporală mai mare de 40 kg - 3,2 ml de preparat (24 pulverizări).

O pulverizare se efectuează în decurs de o secundă.

În locurile de întreținere și odihnă a animalelor și în alte locuri unde pot exista paraziți (așternuturi, covorașe, crăpături în podea și mobilier) se pulverizează de la o distanță de 30-40 cm din calculul de 10 ml de preparat (75 pulverizări) la 1 m².

8. PERIOADA DE AȘTEPTARE

Nu este cazul.

9. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

În loc uscat, ferit de lumină, inaccesibil copiilor, plasat la temperaturi de la +5 până la +25 ° C.

A nu se păstra cu alimente, băuturi și hrana pentru animale.

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

10. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR

Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deșeu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu cerințele locale. Solicitați medicului veterinar informații referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste măsuri contribuie la protecția mediului.

Produsul nu trebuie să fie deversat în cursuri de apă datorită pericolului pentru pești și alte organisme acvatice. Nu contaminați lacurile, cursurile de apă sau canalizarea cu produsul sau cu ambalajul acestuia.

11. ATENȚIONĂRI SPECIALE (*interdicții*)

Tratamentul cu preparat se efectuează în aer liber sau într-o încăpere bine ventilată, ținând animalul până la uscarea completă a blănii.

În timpul prelucrării animalelor cu preparat se interzice fumatul, consumul băuturilor și alimentelor. La prelucrarea unui număr mare de animale se recomandă purtarea unei măști de protecție respiratorie. A se evita contactul preparatului cu mucoasele și pătrunderea acestuia în interior. A nu se pulveriza lângă flacără deschisă, a nu se admite supraîncălzirea preparatului. În urma contactului cu preparatul sunt posibile reacții alergice (strănut, lăcrimarea ochilor), care trec rapid. În caz de contact accidental al preparatului cu pielea sau mucoasele, spălați imediat cu multă apă, iar dacă preparatul a pătruns în interior – consultați imediat medicul. La finisarea prelucrării spălați bine mâinile cu apă caldă și săpun. Se interzice scăldatul și dezmierdarea animalelor timp de 48 de ore după prelucrare. Supravegheați animalului să nu se lingă pe blană după prelucrare.

12. PERIOADA DE VALABILITATE

24 luni. A nu se utiliza după expirarea termenului de valabilitate indicat pe ambalaj. Perioada de valabilitate a produsului medicinal veterinar după prima deschidere a ambalajului primar: 1 an

13. STATUT LEGAL

- *se eliberează în baza prescripției veterinare.*

14. NATURA ȘI COMPOZIȚIA AMBALAJULUI PRIMAR

Flacoane din polimer cu pulverizator a câte 30, 50, 75, 100, 150, 200 ml.

15. DATA ULTIMEI REVIZUIRI A TEXTULUI

12.2019

NUMAI PENTRU UZ VETERINAR