

VIROCID

Dezinfectant concentrat cu spectru larg

COMPOZIȚIE: Fiecare litru are în compoziție următoarele:

Clorură de alchildimetilbenzil-amoniu	170,60 g
Clorură de didecildimetil-amoniu	78,00 g,
Glutaraldehydă	107,25 g.
Alcool - isopropanol	146,25 g
Derivați de terebentină - Ulei de pin.....	20,00 g

PROPRIETĂȚI FARMACOLOGICE:

VIROCID are un spectru larg de activitate împotriva bacteriilor gram-pozitive și gram-negative (inclusiv sporulate și nesporulate), virusuri, fungi, drojdii, mucegaiuri și alge, chiar și în prezența unor substanțe organice. Dezinfectantul este foarte economic de utilizat. Caracterizat printr-o atitudine atentă la suprafața tratată, stabilitate ridicată și siguranță în utilizare. Soluțiile sale de lucru sunt neutre și nu este agresiv.

VIROCID este eficient împotriva la **VIRUSURI**: Parvovirus, Hepatite (Hepatita A, B, C și E), Virusul bolii Carré, Virusul gripal (Influența), Herpes virus (Herpes tip 1 și 2), Bronșita infecțioasă, Parvovirus (tip paramixovirus1 și 3) Virusul gripei aviare (Newcastle), Adenovirus.

VIROCID este eficient împotriva la **BACTERII**: Salmonella, Escherichia Colli, Leptospiroza, Streptococcus, Pseudomonas, Klebsiella, Chlamydia, Staphylococcus aureus, Proteus Vulgaris.

VIROCID este eficient împotriva la **FUNGI**: Candida albicans, Aspergillus, Mycosporum, Trichophyton, Saccharomyces Cerevisiae, Oidium lactis.

VIROCID este un agent de curățare eficient, prezența glutaraldehydă asigură un efect de dezodorizare (elimina mirosul de urină și amoniac în adăpostul pentru animale).

DESCRIERE: Dezinfectant, bactericid, virucid și fungicid.

INDICAȚII DE UTILIZARE:

- pentru dezinfecția suprafețelor (pereți și podele) în spitale și alte spații pentru îngrijirea sănătății;
- pentru dezinfecția suprafețelor, echipamentelor și ustensilelor în halele pentru creșterea animalelor, în cabinete și clinici veterinare;
- pentru dezinfecția asupra mijloacelor de transport care sunt utilizate pentru transportul animalelor și transportul produselor alimentare, abatoare, incubatoare;
- pentru dezinfecția, echipamentelor și ustensilelor în industria alimentară, piscicultură și industria de preparare a furajelor;

MOD DE APLICARE:

I. Pentru dezinfecția suprafețelor (pereți și podele) în spitale și alte spații pentru îngrijirea sănătății:

1) Suprafețele vor fi curățate cu un detergent CID LINES;

2) După clătirea suprafeței și uscarea acesteia se va aplica VIROCID în concentrație de 0.25% - 0.5% (1:400 - 1:200) prin pulverizare (1L de soluție pe 4 m²).

II. Pentru dezinfecția suprafețelor, echipamentelor și ustensilelor în halele pentru creșterea animalelor, în cabinete și clinici veterinare:

1) Utilizând un detergent CID LINES se va curăța manual sau mecanic zonele unde va fi aplicat produsul pentru a se îndepărta toate depunerile;

2) După clătirea suprafeței și uscarea acesteia se va aplica VIROCID în concentrație de 0.25% - 0.5% (1:400 - 1:200) prin pulverizare (1L de soluție pe 4 m²). Pentru adăposturile de animale utilizând un dispozitiv de creare a aerosolilor se vor utiliza 1-2 L VIROCID în 4 L de apă pentru 1000 m³.

III. Pentru dezinfecția încălțăminte se va utiliza VIROCID în concentrație de 1% (1:100) iar soluția va fi schimbată de 2-3 ori pe săptămână.

IV. Pentru dezinfecția asupra mijloacelor de transport care sunt utilizate pentru transportul animalelor:

1) Mijloacele de transport vor fi curățate inițial cu un detergent CID LINES;

2) După clătire se va aplica VIROCID în concentrație de 0.5% prin pulverizare. Pentru dezinfectoarele rutiere se va utiliza VIROCID în concentrație de 1% (1:100).

V. Pentru dezinfecția suprafețelor (pereți și podele), echipamentelor și ustensilelor în industria alimentară și industria de preparare a furajelor:

- 1) Inițial vor fi curățate cu un detergent CID LINES;
- 2) După clătirea suprafeței și uscarea acesteia se va aplica VIROCID în concentrație de 0.25% - 0.5% (1:400 - 1:200) prin pulverizare (1 L de soluție pe 4 m²);
- 3) Se lasă în contact timp de 20 de minute după care se clătește.

VI. Pentru dezinfectia mijloacelor de transport care sunt utilizate pentru transportul produselor alimentare:

- 1) Mijloacele de transport vor fi curățate inițial cu un detergent CID LINES;
- 2) După clătirea suprafeței și uscarea acesteia se va aplica VIROCID în concentrație de 0.25% - 0.5% (1:400 - 1:200) prin pulverizare (1 L de soluție pe 4 m²);
- 3) Se lasă în contact timp de 15 de minute după care se clătește.

VII. Ouă, pardoseli, pereți, incubatoare și alte echipamente.

Ouă: VIROCID: max. 0,25% pulverizare pe ouă (în țările în care acest lucru este permis).

VIII: Camere goale, mașinile de incubare goale, echipamente, containere pentru subproduse, încăperi sanitare:

- Spray: VIROCID : 0,25% - 0,5%.
- Spumare: VIROCID: 0,25% - 0,5%
- Aerosoli: 1- 2L VIROCID + 4 litri de apă / 1000 m³.

Prelucrarea dulapurilor de ecloziune se va efectua prin aerosoli: 50 ml VIROCID + 250 ml apă/ 100 m³. Prelucrarea prin aerosoli a dulapurile de ecloziune în procesul de producție: (este permisă deasemenea îndată după încărcarea ouălelor) : 0,01% – 0,25% VIROCID .

IX. Pentru îngrijire personală - dezinfectia de îmbrăcăminte:

- Adauga 0,25-0,5% la începutul ciclului de spălare.

X. Pentru a dezinfecta paiele din grajd, trebuie de urmat indicațiile pas cu pas, programul de sănătate prevede respectarea normelor de bază a sistemului de management al siguranței alimentelor:

1. Goliți dispozitivele de alimentare și / sau demontarea echipamentului.
2. Aplicați curățare uscată (elimina gunoiul de paie și praf, curățați gunoiul de grajd ...).
3. Aplicați detergent alcalin (pentru îndepărtarea grăsimii și a proteinei); dacă este necesar se clătește detergent acid.
4. Se clătește și se lasă să se usuce.
5. Dezinfectați cu VIROCID prin (Spray, spumă sau aerosol).
6. Se assemblează echipamentul demontat + se acoperă podeaua cu așternut de paie proaspete.
7. Dezinfectia așternutului:

- Utilizarea de aerosol încălzit: 1 – 2 L VIROCID + 4 litri de apă / 1000 m³

- Spray 0,25% VIROCID. Umeziți așternut de paie, fără de impregnare continuă.

Notă: În cazul pardoselilor murdare, acoperite cu așternut de paie utilizate: spray de 0,5% VIROCID.

REAȚII ADVERSE

Evitați contactul direct cu pielea membranele și mucoasele ochiului, are acțiune iritantă și un efect de sensibilizare.

CONTRAINDICAȚII

Hipersensibilitate la medicament.

INSTRUCȚIUNI SPECIALE

A nu se lăsa la îndemîna copiilor și persoanelor neautorizate!

Pentru a lucra cu VIROCID nu este permis femeilor însărcinate și care alăptează, persoanele cu vârsta sub 18 ani, persoanelor neautorizate și persoanelor ce au contraindicații pentru utilizarea cu dezinfectante.

În timpul manipulării cu VIROCID persoanele trebuie să fie îmbrăcate în echipament de protecție: (salopetă, mănuși de cauciuc, mască de gaze și ochelari de protecție). În timpul lucrului este interzis fumatul, băutul și mîncatul. Atunci când se pregătește soluțiile de lucru trebuie evitate pulberile care se încadrează pe piele, ochi și sistemul respirator. La sfârșitul lucrului mâinile și fața trebuie să fie spălate cu apă caldă și săpun, clătiți gura cu apă curată.

CONDIȚII DE PĂSTRARE

A se păstra în loc uscat, în ambalajul original, bine închis, la temperatura mai mică de 25°C, protejat de lumina directă, protejat de surse de căldură și ferit de îngheț. Păstrați-l departe de alimente, băuturi și furaje animale.

MOD DE PREZENTARE: Flacoane de 100 ml, 1000 ml și 10 L.

Producător: CID LINES BV- The Professional Hygiene Company, Belgia.

Distribuitor: S.A "Farmavet", MD-2059, Republica Moldova, Chișinău, Petricani 198. Tel.: 31-72-70; 31-72-67; 99-92-89; Fax: 31-72-68;

VIROCID - BOVINE

Tipul bacteriei	Diluția	Boala
Bacillus cereus	0,25% - 0,5%	Mastite
Clostridium perfringens	0,5 %	Enterite hemoragice, Abomazite, Enterotoxemii, Timpanie, Gangrenă gazoasă, Moarte subită.
Corynebacterium pseudotuberculosis	0,25 %	Limfadenite ventrală, Abcese, Dermatite, Avort spontan, Mastite.
Escherichia coli	0,25% - 0,5%	Diaree, Septicemii, Mastite acute
Klebsiella pneumoniae	0,25%	Mastite
Lactobacillus plantarum	0,25%	Acidoză lactică
Listeria monocytogenes	0,25%	Listerioză: septică, infecții fetale, metrite, avort, encefalite
Pasteurella multocida	0,25%	Pasteureloză: pneumonie, boli de piele
Proteus mirabilis	0,25% - 0,5%	Infecții ale aparatului: respirator, gastrointestinal și genito-urinar, răni, abcese, dermatite
Pseudomonas aeruginosa	0,25-0,5-1%	Mastite, avort, infecții genitale
Salmonella choleraesuis	0,25%	Salmoneloză, Enterite, Avort
Salmonella enteritidis	0,25 – 0,5%	Salmoneloză
Salmonella hadar	0,25%	Salmoneloză
Salmonella heidelberg	0,125%	Salmoneloză, Avort
Salmonella infantis	0,5%	Salmoneloză
Salmonella typhimurium	0,125- 0,25%	Salmoneloză, Enterite, Avort
Salmonella virchow	0,25%	Salmoneloză
Staphylococcus aureus	0,25-0,5- 1%	Mastite
Staphylococcus hyicus	0,25- 0,5%	Boli de piele, adesea combinate cu scabie
Brucella suis biovar	0,25 – 0,5 %	Bruceloză, Avort
Bacillus anthracis	0,5%	Antrax (zoonoze)
FUNGI și DROJDII		
Absidia corymbifera	0,25% - 4%	Avort, Zygomycoză
Candida albicans	0,25-0,5-1%	Candidoză: masite, avort
Geotrichum candidum	0,1%	Geotrichoză: mastite, avort, bronșic, faringiene, tulburări intestinale
Trichophyton mentagrophytes	0,25 – 2%	Dermatofitoză (tricofție)
VIRUȘI		
Virusul Febrei Aftoase	0,5 – 1%	Febra Aftoasă (zoonoze)
Influența H5N1	0,1 -0,25%	Gripa Aviară
Virusul vezicular stomatit	1,5%	Stomatita veziculoasă
Virusul Aujeszky/Pseudorabies	0,25%	Virusul bolii Aujeszky / Pseudorabic
Reovirus	0,25- 0,5%	Reovirus (aparatului respirator și gastrointestinal)
BVD	1 %	Diareea Virală Bovină
Bovine enterovirus	0,1%	Enterovirus bovin (avort, infertilitate, diaree, infecții respiratorii)
Mycoplasma mycoides	1 %	Pleuropneumonia contagioasă bovină

VIROCID - PORCINE

Tipul bacteriei	Diluția	Boala
Brachyspira hyodysenteriae	0,25%	Dezinterie (inflamația intestinului gros)
Campylobacter jejuni	0,25%	Diareea porcelor
Clostridium perfringens	0,5%	Scroafe: moarte subită, gangrenă Porcii: diaree hemoragică, necroză, moarte.
Escherichia coli	0,25 – 0,5%	Diaree, mastită
Klebsiella pneumoniae	0,25%	Mastite, endometrită
Listeria monocytogenes	0,25%	Listerioză: sepsis, pneumonie
Mycoplasma hyopneumoniae	0,25%	Pneumonie enzootică (tuse cronică)
Pasteurella multocida	0,25%	Pasteureloză , pneumonie
Salmonella choleraesuis	0,25%	Salmoneloză, pneumonie, hepatite, vasculită cerebrală
Salmonella enteritidis	0,25- 0,5%	Salmoneloza
Salmonella hadar	0,25%	Salmoneloza
Salmonella heidelberg	0,125%	Salmoneloza
Salmonella infantis	0,5%	Salmoneloza
Salmonella typhimurium	0,125- 0,25%	Salmoneloza
Salmonella typhisuis	0,25%	Salmoneloza: necroză, infecții intestinale, inflamarea ganglionilor limfatici, sepsis
Staphylococcus aureus	0,25-0,5-1%	Staphylococcus aureus rezistent la metilina
Staphylococcus hyicus	0,25%	Boala porcului gras, sepsis
Streptococcus suis	0,25%	Artrită, septicemie, meningită, endocardită(porcii)
Brucella suis biovar	0,5%	Bruceloză: metrite, mastite, infertilitate, avort, bacteriemie
Bacillus anthracis	0,5%	Antrax
FUNGI și DROJDII		
Aspergillus fumigatus	0,25-0,5%	Mycotoxicoze: avort, alăptarea, afectare ficatului, imunosupresie (scroafe)

Fusarium dimerum	0,25%	Mycotoxicoze: prolaps rectal / vaginal, vagin inflammat, făt mort
Geotrichum candidum	0,1%	Geotrichosis: noduli la ganglionii limfatici
Trichophyton mentagrophytes	0,5%	Dermatofitoză (tricoфіție)
VIRUȘI		
Virusul Febrei Aftoase	0,1-0,5%	Febra aftoasă
H1N1 Influența A (Gripa Mexicană)	0,25%	Gripa porcină / Gripa Mexicană
Pesta porcină	0,1- 0,25%	Pesta porcină
Boala Talfan	1% - 4%	Boala Teschen / Boala Talfan: paralizie
Virusul bolii veziculoase a porcului	0,5%	Boala veziculoasă a porcului
Virusul stomatitei veziculoase	1,5%	Stomatita veziculoasă
Virusul Aujeszky/Pseudorabies	0,25%	Bola Aujeszky / Pseudorabic
Virusul febrei porcine africane	0,5%	Febra porcină Africană
PRRS	0,25%	Sindromul respirator și reproductiv porcine
Circovirus porcine	0,5-1%	Circovirusul porcine / Sindromul Wasting multisistemica porcine

VIROCID – PĂSĂRI

Bordetella avium	0,25 %	Bordetelioză: sinusită, tuse, secreții nazale
Campylobacter jejuni	0,25 %	Enterită, moarte
Clostridium perfringens	0,5 %	Enterotoxemia acută sau cronică a enteritei necrotice
Enterococcus faecium	0,25-0,5-2 %	Enterococ: endocardită, septicemie, diaree
Enterococcus hirae	0,25 – 0,5 %	Enterococ: endocardită, septicemie, diaree
Escherichia coli	0,25 -0,5 %	Colibaciloza: sepsis, inflamația sacilor alveolari, pericardită, perihepatită.

Haemophilus paragallinarum	0,25 %	Coriza infecțioasă: secreție nazale și oculare, strănut, edem facial
Klebsiella pneumoniae	0,25 %	Klebsiella: diaree, sepsis, moartea embrionului și moartea puilor
Listeria monocytogenes	0,25 %	Listerioza: septicemie, encefalită locală, moarte subită
Mycoplasma gallisepticum	0,25 %	Micoplasmoză: drenajul sistemului respirator
Mycoplasma synoviae	0,25 %	Tendinită, bursită, bronșită, inflamația sacilor alveolari
Ornithobacterium rhinotracheale	0,25 %	Infecții respiratorii
Pasteurella multocida	0,25 %	Pasteureloză / Holera aviară: infecții respiratorii, diaree, șchiopătat, moarte subită
Proteus mirabilis	0,25 -0,5- 1%	Omfalită (infecția sacului vitelin)
Pseudomonas aeruginosa	0,25 -0,5- 1%	Pseudomonas: infecții respiratorii, moartea embrionului, dispnee, sepsis, moarte
Salmonella choleraesuis	0,25%	Salmoneloză
Salmonella enteritidis	0,25 – 0,5%	Salmoneloză
Salmonella pullorum	0,25%	Salmoneloză: Puluroza, Diaree bacilară
Staphylococcus aureus	0,25-0,5-1%	Stafilococoză: infecție, septicemie, șchiopătat
Staphylococcus hyicus	0,25-0,5%	Leziuni ale pielii
FUNGI și DROJDII		
Aspergillus fumigatus	0,25-0,5%	Aspergiloză
Candida albicans	0,25-0,5%	Candidoza: funcționarea necorespunzătoare a culturii
VIRUȘI		
Gumboro virus	0,25-0,5%	Boala Gumboro, Bursita infecțioasă
H1N1 Influența A	0,25%	Gripa Mexicană
Virus Newcastle	0,25%	Paramixovirus 1 / Boala de Newcastle
H5N1 Influența	0,25%	Influența aviară tip H5N1
Reovirus	0,25-0,5%	Artrita virală
Virus Marek	0,25%	Boala Marek

Virusul bronșitei infecțioase	0,25%	Bronșita infecțioasă
Laringotraheita	0,25%	Laringotraheita infecțioasă