

PROSPECTUL MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR TETRAVIN

soluție injectabilă

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament de uz veterinar deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.

- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului veterinar sau farmacistului.

- Dacă s-au manifestat orice reacții adverse, adresați-vă medicului veterinar, farmacistului veterinar sau Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor.

1. DENUMIREA ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ȘI ALE PRODUCĂTORULUI/FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

Întreprinderea Particulară „OLKAR-AgroZooVet-Service”, str. Eroilor Maidanului (Lenin), 272B, or. Șargorod, reg. Vinița, 23500, Ucraina
tel. / fax: (0432) 55-14-28, (0432) 55-14-27

2. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, CONCENTRAȚIA ȘI FORMA FARMACEUTICĂ ALE ACESTUIA

1 ml de medicament conține substanțe active (mg):

Vitamina A - 50 000 UI;

Vitamina D₃ - 25 000 UI;

Vitamina E – 20 ;

Vitamina F - 5.

Lista excipienților: hidroxitoluen butilat, ulei de floarea soarelui.

3. INDICAȚII TERAPEUTICE

Prevenirea și tratamentul hipovitaminozei A, D și E, osteodistrofii alimentare și secundare, cetoză, rahitism, hipocalcemie și hipofosfatemie postpartum, distocii postpartum, urolitiază, bronhopneumonii, boli gastrointestinale, boala mușchilor albi, metrită, fracturi osoase, stimularea creșterii și dezvoltării animalelor tinere, precum și a funcției reproductive la masculii reproducători.

4. CONTRAINDICAȚII

Nu sunt.

5. REACȚII ADVERSE

Nu sunt.

6. SPECII ȚINTĂ

Bovine, cabaline, ovine, caprine, porcine.

7. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, METODA, MODUL DE ADMINISTRARE ȘI DOZA PRESCRISĂ

Medicamentul se administrează intramuscular sau subcutanat, în scop profilactic, o dată la 7-10 zile, în scop terapeutic - timp de 5 sau 7 zile, până la recuperare (6-8 administrări), apoi se trece la doze profilactice. Per os medicamentului se utilizează zilnic în dozele profilactice indicate în tabelul de mai jos.

Specia de animale	Doza preparatului, ml, i/m s/c		Doza per os, ml/zi
	De profilaxie, o data la 10 zile	De tratament, o dată la 5 zile	
Vaci în repausul mamar	10-12	10-12	—
Vaci în lactație cu productivitatea 6-10 mii litri de lapte	12-15	12-15	—
Tineretul bovin (la 100 kg m. c.)	4-5	5-6	0,5-0,6
Ovine, caprine	1-1,5	1,5-2	0,2-0,25
Scroafe (30-45 zile până la fătare)	5	5-6	0,4-0,5
Scroafe în lactație	5-6	6-7	0,6-0,7
Purcei (20-40 kg)	1,0-1,5	1,0-1,5	0,2-0,25
Iepe în gestație	7-8	8-10	1,0
Iepe în lactație	8-10	10-12	1,5
Tineretul cabalinelor cu vârsta 6-12 luni.	2,0	2,0-3,0	0,2-0,3

Dozele preparatului sunt calculate în funcție de vitamina A.

8. PERIOADA DE AȘTEPTARE

Carne și organe - zero zile.

Lapte - zero zile.

9. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

Loc uscat și întunecat, inaccesibil copiilor la o temperatură de +5 până la +15 ° C.

10. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A

DEȘEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR

Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deșeu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu cerințele locale. Solicitați medicului veterinar informații referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste măsuri contribuie la protecția mediului.

11. ATENȚIONĂRI SPECIALE

Cînd se utilizează preparatul, dietele animalelor trebuie să fie echilibrate în ceea ce privește proteinele, calciul, fosforul, magneziul și oligoelemente.

12. PERIOADA DE VALABILITATE

24 luni.

13. STATUT LEGAL

- *se eliberează fără prescripție veterinară.*

14. NATURA ȘI COMPOZIȚIA AMBALAJULUI PRIMAR

Flacoane din sticlă de culoare închisă, sigilate cu dopuri de cauciuc sub o capsă de aluminiu, în volum de 10, 50, 100 ml.

15. DATA ULTIMEI REVIZUIRI A TEXTULUI

11.2022

NUMAI PENTRU UZ VETERINAR