

A. PROSPECTUL

PROSPECTUL

1. Denumirea medicamentului de uz veterinar

Soluție glucoză 40% injectabilă

2. Compoziție

Substanța activă:

100 ml de medicament conține (g):
glucoză cristalină - 40,0.

Excipient: apă pentru preparate injectabile.

3. Specii țintă

Bovine, cabaline, ovine, caprine, porcine, câini, pisici.

4. Indicații de utilizare

Soluția de glucoză 40% este utilizată în terapia complexă pentru a trata animalele cu forme severe de boli infecțioase acute și parazitare ale sângelui, insuficiență cardiovasculară cronică și tensiune arterială scăzută. Glucoza face parte din fluidele anti-șoc și de înlocuire a sângelui, care sunt prescrise animalelor în stare de șoc, colaps sau cu pierderi mari de sânge. O soluție de glucoză 40% este utilizată la animale pentru infecții toxice, otrăviri cu medicamente, monoxid de carbon, mercur, arsen, acid cianhidric și alte substanțe, edem pulmonar, boli hepatice (hepatită, ciroză), scăderea diurezei. Se prescrie pentru boli ale tractului digestiv cu manifestări de intoxicație și crampe musculare, hipotensiune arterială și atonie a stomacului la rumegătoare, cetoză, hemoglobinurie postpartum și toxemie la vaci de lapte, cetonurie la ovine, hemoragii gastrointestinale, pulmonare și alte sângerări interne (ca agent hemostatic).), diateza hemoragică, iar pentru animalele slabe și epuizate, ca supliment energetic și alimentar.

5. Contraindicații

Hiperglicemie, diabet zaharat, leziuni cerebrale traumatice severe, accident vascular cerebral acut.

6. Atenționări speciale

Nu există.

Precauții speciale pentru utilizarea în siguranță la speciile țintă:

Medicamentul se administrează intravenos lent, încălzit la temperatura corpului.

Precauții speciale care vor fi luate de persoana care administrează medicamentul de uz veterinar la animale:

Când lucrați cu soluție glucoză 40% injectabilă, trebuie să respectați regulile generale de igienă personală și măsurile de siguranță prevăzute atunci când lucrați cu medicamente de uz veterinar. În cazul contactului accidental al medicamentului cu pielea sau ochii, acestea trebuie spălate imediat cu multă apă. Persoanele cu hipersensibilitate la componentele medicamentului ar trebui să evite contactul direct cu medicamentul.

Precauții speciale pentru protecția mediului:

Nu este cazul.

Utilizarea în timpul gestației, lactației sau a ouatului:

Nu există restricții.

Interacțiunea cu alte medicamente de uz veterinar și alte forme de interacțiune:

Glucoza este un agent oxidant, de aceea nu se administrează în aceeași seringă cu hexametilentetramină, soluții alcaline, anestezice generale, hipnotice și soluții alcaloide. Glucoza slăbește efectul analgezicelor, inactivează streptomycina, reduce eficacitatea nistatinei, prelungește efectul adrenalinei și penicilinei.

Supradozare:

În caz de supradozaj, poate apărea comă hiperglicemică.

Incompatibilități majore:

Glucoza slăbește efectul analgezicelor, inactivează streptomicina și reduce eficacitatea nistatinei. Nu-l administrați în aceeași seringă cu hexametilentetramină, soluții alcaline, anestezice generale, hipnotice sau soluții alcaloide.

Evenimente adverse

Bovine, cabaline, ovine, caprine, porcine, câini, pisici.

Raportarea evenimentelor adverse este importantă. Permite monitorizarea continuă a siguranței unui produs. Dacă observați orice reacții adverse, chiar și cele care nu sunt deja enumerate în acest prospect, sau credeți că medicamentul nu a avut efect, vă rugăm să contactați în mai întâi medicul veterinar. De asemenea, puteți raporta evenimente adverse către deținătorul certificatului de înregistrare sau reprezentantul local al deținătorului certificatului de înregistrare folosind datele de contact de la sfârșitul acestui prospect sau prin sistemul național de raportare: {detalii sistem național}.

8. Doze pentru fiecare specie, căi de administrare și metode de administrare

Medicamentul se administrează intravenos de 1-2 ori pe zi la 1 animal în doze (ml):

bovine 150 - 370;

viței 100-150;

cabaline 100-300;

mînji 100-150;

porcine 40-60;

ovine, caprine 50-70;

câini 20-30;

pisici 5-10.

9. Recomandări privind administrarea corectă

Medicamentul se administrează intravenos lent, încălzit la temperatura corpului.

Nu utilizați soluție glucoză 40% al medicamentului de uz veterinar dacă observați descrierea semnelor vizibile de deteriorare.

10. Perioade de așteptare

Carne și lapte: zero zile.

11. Precauții speciale pentru depozitare

A nu se păstra la temperatură mai mare de 0 °C - 25°C.

12. Precauții speciale pentru eliminare

Medicamentele nu trebuie eliminate în apele uzate sau deșeurile menajere.

Utilizați sistemele de returnare a medicamentelor de uz veterinar neutilizate sau a deșeurilor provenite din acestea, în conformitate cu legislația națională și cu sistemele de colectare aplicabile medicamentului de uz veterinar respectiv.

Solicitați medicului veterinar sau farmacistului informații referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare.

13. Clasificarea medicamentelor de uz veterinar

Se eliberează fără prescripție veterinară

14. Numerele certificatelor de înregistrare și dimensiunile ambalajelor

Flacoane de sticlă de 50, 100, 200, 400 și 500 ml.

Este posibil ca nu toate dimensiunile de ambalaj să fie comercializate.

15. Data ultimei revizuirii a prospectului

10.2024

Informații detaliate privind acest medicament de uz veterinar sunt disponibile în Baza de Date a Republicii Moldova - Registrul de Stat al medicamentelor de uz veterinar (<https://registru.ansa.gov.md/>).

16. Date de contact

Deținătorul certificatului de înregistrare și producătorul responsabil pentru eliberarea seriei și date de contact pentru raportarea reacțiilor adverse suspectate:

Întreprindere Individuală „O.L.KAR-AgroZooVet-Service”

Sf. Gheroev Maidan (Lenin), 272V, Shargorod, regiunea Vinnitsa, Ucraina, 23500 tel.: (043) 442-12-54, fax: (043) 442-17-87, e-mail: vet@olkar.com.ua, www.agroolkar.com.ua

Reprezentanți locali și date de contact pentru raportarea reacțiilor adverse suspectate:

Republica Moldova

SA "Farmavet", Chișinău, Petricani 198.

Tel.: 022 - 31-72-70; 022-31-72-67; 022- 99-9289;

Fax: 022-31-72-68; www.farmavet.md

E-mail: farmavet2017@gmail.com

Pentru orice informații referitoare la acest medicament de uz veterinar, vă rugăm să contactați reprezentantul local al deținătorului certificatului de înregistrare.

Republica Moldova

Republica Moldova

SA "Farmavet", Chișinău, Petricani 198.

Tel.: 022 - 31-72-70; 022-31-72-67; 022- 99-9289;

Fax: 022-31-72-68; www.farmavet.md

E-mail: farmavet2017@gmail.com

17. Alte informații

NUMAI PENTRU UZ VETERINAR